

<p>HVER 2.TIME DE 6 FØRSTE TIMENE</p> <p>DERETTER HVER 4.TIME (KL 06 – 10 – 14 – 18 – 22 - 02)</p> <p>NATT: Pasienten skal vanligvis få sove. Resp.frekvens telles, sedasjon oppgis som «S» = normal søvn. Dette gjelder ikke hvis pasienten er ustabil!</p>	NRS
	Sensorisk nivå* (kuldetest etter skjema første døgn , deretter ved behov)
	Respirasjonsfrekvens
	Sedasjon
	Kvalme og oppkast (0-3)
	Innstikksted
	Motorisk blokad (0-3)**
	Kløe
Urinretensjon	
Kontroller pumpeinnstillinger	
<p>TILT hver 2.time de 6 første timene, deretter ved endringer i klinisk tilstand og alltid etter økt infusjonshastighet og etter bolusdoser</p> <p>Observer/dokumenter f.o.m EDA-innleggelse – t.o.m 24 timer etter fjerning!</p>	

<p>KONTAKT ANESTESILEGE PÅ 3683 VED:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ryggsmerter eller lammelse av bena (motorisk blokad). Dette kan være et symptom på epiduralt hematom/ abscess. • Systolisk BT < 80 • Puls < 45 • Respirasjonsfrekvens < 8

****Bromage skala (motorisk blokade)**

- 0) Normal bevegelse i beina
- 1) Bøyer hoftene (kneløft)
- 2) Kan ikke bevege kne, beveger fotledd
- 3) Kan ikke bevege underekstremitetene

***Sensorisk nivå**

