

 SØRLANDET SYKEHUS				Klinikknivå		Retningslinje	
Perifer venekanyle (PVK) - rekvisisjon - SSK						Side 1 av 1	
Dokumentplassering: II.SOK.AIO.SSK.2.c-30			Godkjent dato: 11.02.2025	Revideres innen: 11.02.2027	Sist endret: 11.02.2025	Revisjon: 2.05	

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Anestesi - SSK/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

HENSIKT

Sikre god oppfølging av pasienter som trenger assistanse fra anestesipersonell for å få lagt perifer venekanyle (PVK).

MÅLGRUPPE

Sykepleiere på sengepost med pasientansvar og anestesipersonell som skal legge PVK.

FREM GANGSMÅTE

- Ring Aksess-team/ anestesisykepleier på telefon 3700 og gi beskjed om at det trengs assistanse fra anesthesiavdelingen for å få anlagt PVK
- Avtal når pasienten kan komme til operasjon ventehall. Eventuelt ved behov, om anestesipersonell kan komme til pasientens avdeling
- Fyll ut PVK rekvisisjonen og la denne følge pasienten/ligge i pasientkurve
- Når PVK er anlagt har bestillende avdeling ansvar for å makulere PVK rekvisisjonen ved utreise
- Mellom kl. 11.00-13.00 og 22.30-08.00, legges PVK på grunn av bemanning kun ved sterk indikasjon

Kryssreferanser

[II.SOK.AIO.SSK.2d-17](#)

[Rekvisisjonskjema - PVK \(til utskrift\) SSK](#)

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Stine Smith, Sindre Ose, Espen Lauritsen	Fagansvarlig: []	Verifisert av: []	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	Dok.nr: D44083
---	----------------------------	-----------------------------	--	--------------------------