

 SØRLANDET SYKEHUS				Klinikknivå		Retningslinje	
Desinfisering ved opphør av isolering						Side 1 av 2	
Dokumentplassering: II.MSK.ISE.HUS.5-2			Godkjent dato: 17.02.2022	Revideres innen: 05.09.2024	Sist endret: 05.08.2024	Revisjon: 1.03	

Klinikknivå/Medisinsk serviceklinikk/Avdeling for intern service/Husøkonom/Smittevern

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 05.09.2024

HENSIKT

Hindre smitteoverføring fra omgivelser, utstyr og inventar og ivareta pasienter og personalets sikkerhet.

MÅLGRUPPE

Ansatte ved husøkonomenheten som foretar desinfisering av rom etter opphør av isolering.

ANSVAR

Ledere og ansatte i husøkonomenheten har ansvar for at hver enkelt renholder får den opplæringen som er nødvendig, og for at prosedyren følges.

FREMANGSMÅTE

Velg riktig desinfeksjonsmiddel. Det er viktig å blande middelet i riktig konsentrasjon.



Virkon:

Bruk: ved de fleste bakterier og virus.

Beskyttelsesutstyr: ved utblanding anbefales å bruke munnbind, øyebeskyttelse, hansker

Blanding: blande flasken fylles med lunkent vann.

Tilsett 1 tablett til en 1/2 liter vann.

Holdbarhet: fem døgn. Merk bruksløsning med dato for utblanding. Du må alltid blande nytt ved desinfeksjon av rom.

Mengde: 1/2-1 liter til hver desinfeksjon av rom

Påføring: bearbeid utstyr og flater med en godt fuktet klut med Virkon. Det er viktig med den mekaniske bearbeidingen/rengjøringen.

Virketid: på synlig rene flater og utstyr i rommet er virketiden 10 minutter. På urene flater og utstyr hvor blod, urin, avføring, sekret, o.l. er synlig tilstede er virketid 30 minutter.



Perasafe

Bruk: ved *Clostridium difficile* og *Tuberkulose*

Beskyttelsesutstyr: ved utblanding anbefales å bruke munnbind, hansker og øyebeskyttelse.

Utblanding: fyll blande flasken med en liter lunkent vann. Tilsett doseposen. Flasken vendes til pulveret er oppløst.

Holdbarhet: 24 timer. Merk bruksløsningen med dato og klokkeslett.

Mengde: 1/2-1 liter til hver desinfeksjon av rom.

Påføring: bearbeid flatene og utstyret med en godt fuktet klut med Perasafe

Virketid: 10 minutter på synlig rene flater

- Ansatte på avdeling klargjør rommet før desinfeksjon.
 - Fjerner tekstil, avfall og løst utstyr
- De fyller ut bestillingskjema for desinfisering.
- Renholder vil gjennom skjemaet, få opplyst isoleringstype og hvilket desinfeksjonsmiddel som skal brukes.
- Hvis skjemaet ikke er utfylt riktig kontakt din leder.
- Bruk beskyttelsesutstyr i henhold til isoleringstype. (Se kryssreferanser)
 - Kontaktsmitte
 - Kontaktsmitte m/munnbind
 - Dråpesmitte
 - Luftsmitte
 - Bruk av åndedrettsvern

Utarbeidet av: Elisabeth Egeli	Fagansvarlig: Husøkonomenheten	Verifisert av: 	Godkjent av: Ass. klinikkssjef Jon Sverre Berg	Dok.nr: D44222
--	--	---	--	--------------------------

 SØRLANDET SYKEHU		Desinfisering ved opphør av isolering			Side: 2
Dokument-id: II.MSK.ISE.HUS.5-2		Utarbeidet av: Elisabeth Egeli	Fagansvarlig: Husøkonomenheten	Godkjent dato: 17.02.2022	Godkjent av: Ass. klinikkssjef Jon Sverre Berg
					Revisjon: 1.03

Klinikknivå/Medisinsk serviceklinikk/Avdeling for intern service/Husøkonom/Smittevern

Vi desinfiserer/rengjør alltid fra rent til urent

1. Sluse/forgang
2. Pasientrom m/seng
3. Bad/toalett

Alle horisontale flater, utstyr og berøringspunkter skal desinfiseres med godt fuktet klut.
Gulv desinfiseres til slutt.

Alt utstyr som er brukt til renhold desinfiseres.
Flergangsmopper/kluter sendes til smittevask på lokalt vaskeri.

Før og etter prosedyren gjennomføres en god håndhygiene.

Henviser til kurs i Læringsportalen som må gjennomføres før utførelse

- Desinfeksjon (smittevask) av smitterom

Kryssreferanser

[I.6.2.6.2.1.2-1](#)

[I.6.2.6.2.2-2](#)

[I.6.2.6.2.2-3](#)

[I.6.2.6.2.2-4](#)

[I.6.2.6.2.2-5](#)

[I.6.2.6.2.2-6](#)

[I.6.2.6.2.2-7](#)

[I.6.2.6.2.2-9](#)

[Håndhygiene](#)

[Tiltak ved isolering](#)

[Kontaktsmitte - plakat](#)

[Kontaktsmitte med munnbind - plakat](#)

[Dråpesmitte - plakat](#)

[Luftsmitte - plakat](#)

[Åndedrettsvern - FFP3 maske](#)

[Desinfeksjon/ smittevask ved opphør av isolering og ved flekkdesinfeksjon](#)