

		<b>Generelle fagprosedyrer</b>		<b>Skjema</b>	
<b>Veiledning til blanding av Penicillin til CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe</b>				Side 1 av 1	
Dokument ID: <b>1.3.10-5</b>		Godkjent dato: <b>02.10.2024</b>	Gyldig til: <b>02.10.2026</b>	Revisjon: <b>3.06</b>	

Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

## Intermitterende infusjon

### Materialet du skal bruke:

- 250 ml 0,9 % NaCl infusjonspose, 2 stk. **KALDE.**
- Penicillin, antall hetteglass svarende til ordinert dose pr døgn **fordelt i to poser.**
- Klorheksidinsprit 5mg/ml
- 2 Sterile kompresser
- 2 Sprøyter (Luer-Lock tupp)
- 2 Kanyler (opptrekkskanyle 40mm)
- Infusjonssett til CADD-pumpen og 1 tilsetningslapp

### Blanding og tilkobling:

1. Desinfiser arbeidsflaten og hendene. Alle gummipropper på hetteglass skal desinfiseres. Ikke ta på sprøytetestempelet eller overgangen mellom kanyle/sprøyte. Bruk steril hanske ved tilberedning.
2. Oppløs stoffet i hvert hetteglass med 8-9 ml NaCl. (Trek ca. 16 ml av 250 ml NaCl infusjonsposen og fordel væsken på 2 hetteglass. Gjenta prosessen.)
3. Hetteglassene ristes for å få en fullstendig oppløsning. Det kan ta flere minutter. La hetteglassene ligge til alt er oppløst (blank løsning). Det kan ta inntil 15-20 minutter.
4. Gjenta punkt 1. før en trekker opp og tilfører penicillin-oppløsningen i posene-  
sakte tempo.
5. Tøm posen for luft.
6. Ferdig utfylt tilsetningslapp settes på infusjonsposene. Viktig å sette på når tid posen er blandet og tidsrom fra første til siste dose.
7. **Posene blandes fortrinnsvis så tett inntil posebyttet som mulig, tidligst 1 time før. Den andre legges i kjøleskap/kjølebag frem til den skal tilkobles pumpe. Hos inneliggende pasienter skal en tilberede en pose av gangen.**
8. Se [Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#) for utfyllende informasjon

Samlet volum: 270 ml

Utarbeidet av: <b>Marianne Jacobsen</b>	Fagansvarlig: <b>Marianne Jacobsen</b>	Godkjent av: <b>Per Engstrand</b>	
--	---	--------------------------------------	--