

**Veiledning til blanding av Cloxacillin til CADD-SOLIS VIP  
infusjonspumpe.**

Side 1 av 1

Dokument ID:  
**1.2.10-6**Godkjent dato:  
**02.10.2024**Gyldig til:  
**02.10.2026**Revisjon:  
**4.02**

Generelle prosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

**Intermitterende infusjon****Materialet du skal bruke:**

- 1 stk. 500 ml 0,9 % NaCl myk infusjonspose. Romtemperert.  
(2 stk 500ml 0,9% NaCl myk infusjonspose hvis pasienten har PVK)
- Cloxacillin, antall hetteglass svarende til ordinert døgndose.
- Klorheksidinsprit 5mg/ml
- 2 Sterile kompresser
- 2 Sprøyter 20ml (Luer-Lock tupp)
- 2 Kanyler (opptrekkskanyle 40 mm)
- Infusjonssett til CADD-pumpen og 1 tilsetningslapp

**Blanding og tilkobling:**

1. Desinfiser arbeidsflaten og hendene. Alle gummipropper på hetteglass skal desinfiseres. Ikke ta på sprøytstempelet eller overgangen mellom kanyle/sprøyte. Bruk steril hanske ved tilberedning.
2. Oppløs stoffet i hvert hetteglass med 8-9 ml NaCl. (Trek ut ca. 16 ml av 500 ml NaCl fra infusjonsposen og fordel væsken på 2 hetteglass. Gjenta prosessen.)
3. Hetteglassene ristes for å få en fullstendig oppløsning. Det kan ta opptil flere minutter.
4. Gjenta punkt 1 før en trekker opp og tilfører cloxacillin-oppløsningen i posen.
5. Tøm posen for luft.
6. Ferdig utfylt tilsetningslapp settes på infusjonsposen. Viktig å sette på når tid posen er blandet og tidsrom fra første til siste dose
7. Kan blandes 1-2 timer før, men fortrinnsvis så tett inntil posebytte som mulig. Oppbevares i romtemperatur.
8. Se [Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#) for utfyllende informasjon

Samlet volum: 520 ml[1.2.10-10](#)[Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#)

Utarbeidet av: <b>Marianne Jacobsen</b>	Fagansvarlig: <b>Marianne Jacobsen</b>	Godkjent av: <b>Per Engstrand</b>	
--	---	--------------------------------------	--