

		<b>Generelle fagprosedyrer</b>		<b>Kliniske fagprosedyrer</b>	
<b>Veiledning til blanding av Piperacillin/Tazobactam til CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe.</b>				Side 1 av 1	
Dokument ID: <b>I.3.10-8</b>		Godkjent dato: <b>02.10.2024</b>	Gyldig til: <b>02.10.2026</b>	Revisjon: <b>4.04</b>	

Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

## Intermitterende infusjon

### Materialet du skal bruke:

- 1 stk 250 ml 0,9% NaCl myk infusjonspose. Romtemperert.  
(1 stk 500ml 0,9% NaCl myk infusjonspose hvis pasienten har PVK)
- Piperacillin/Tazobactam, antall hetteglass svarende til ordinert dose pr døgn.
- Klorheksidinsprit 5mg/ml
- 2 Sterile kompresser
- 2 Sprøyter (Luer-Lock tupp)
- 2 Kanyler (opptrekkskanyle 40 mm)
- Infusjonssett til CADD-pumpen
- 1 Tilsetningslapp

### Blanding og tilkobling:

1. Desinfiser arbeidsflaten og hendene. Alle gummipropper på hetteglass og ampullehalser skal desinfiseres. Ikke ta på sprøytetempellet eller overgangen mellom kanyle/sprøyte. Bruk steril hanske på en hånd ved tilberedning.
2. Oppløs stoffet i hvert hetteglass med 10 ml **sterilt vann**. Dunk opp tørrstoffet til en «ball» før du tilsetter væske.
3. Hetteglassene ristes for å få en fullstendig oppløsning. Det kan ta inntil 40-45 minutter.
4. Gjenta punkt 1. før en trekker opp og tilfører Piperacillin/Tazobactam - oppløsningen i posen.
5. Tøm posen for luft.
6. Ferdig utfylt tilsetningslapp settes på infusjonsposen. Viktig å sette på når tid posen er blandet og tidsrom fra første til siste dose.
7. Kan blandes 1-2 timer før, men fortrinnsvis så tett inntil posebytte som mulig. Oppbevares i romtemperatur.
8. Se [Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#) for utfyllende informasjon

Samlet volum: ca.300/550 ml

[I.3.10-10](#)

[Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#)

Utarbeidet av: <b>Marianne Jacobsen</b>	Fagansvarlig: <b>Marianne Jacobsen</b>	Godkjent av: <b>Per Engstrand</b>	
--	---	--------------------------------------	--