

A02B C02	PANTOPRAZOL Pantoprazol®, Somac®				Blandekort for voksne
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
40 mg inj.subst., hetteglass	Tilsett 10 ml NaCl 9 mg/ml til 40 mg tørrstoff ^{1,2 *}	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre ^{1,2} <u>Fortynningsvæske^{1,2}</u> NaCl 9mg/ml eller glukose 50 mg/ml	<u>IV injeksjon^{1,2,4}</u> Over minst 2 minutter <u>IV infusjon ^{1,2,4}</u> Over 15 minutter.	<u>Stamløsning ^{1,3,4}</u> 12 timer i RT 24 timer i KJ <u>Fortynnet løsning ^{1,3,4}</u> 12 timer i RT 24 timer i KJ	OBS! Tromboflebitt ^{1,2,4} Kan gi hodepine, magesmerter, diare, kvalme og oppkast ^{1,2,4} . Ekstravasasjon kan gi vevsskade ⁴ .
Konsentrasjon stamløsning: 4 mg/ml					
Tilleggsopplysninger: * Ved bruk av hele hetteglass til infusjon, kan tørrstoffet blandes direkte i 50-100 ml NaCl 9 mg/ml ² . Y-settforlikelig væsker ^{1,2,4}: NaCl 9 mg/ml og glukose 50 mg/ml. Forslag til administrasjonsmåte ¹: Tilsett 10 ml NaCl 9 mg/ml injeksjonsvæske til 40 mg tørrstoff. Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre med 100 ml NaCl 9 mg/ml injeksjonsvæske eller 100 ml glukose 50 mg/ml injeksjonsvæske. Oppløsningen gis IV i løpet av 2-15 minutter.					
Referanseliste: 1. Statens legemiddelverk, norske preparatomtaler (SPC). 2. Injectable medicines administration guide, 3. Ed., oktober 2010, The Pharmacy Department University College London Hospitals, Wiley-Blackwell 3. Statens legemiddelverk, Norske legemiddelstandarder, kapittel 6 Oppbevaringstider og veiledende brukstider for sterile legemidler etter anbrudd. 4. Micromedex. Tilgjengelig via Helsebiblioteket.					

Utarbeidet av Sykehusapoteket i Kristiansand

Dato: 13.07.2016