

A11 EB	Vitamin B og vitamin C til parenteral bruk PABRINEX INTRAVENOUS HIGH POTENCY INJECTION® SYNDREX ®			Blandekort for voksne	
Styrke		Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
Ampulle 1 - 5 ml inneholder: ^{1,2} Tiamin (vitamin B1) 50 mg/ml Riboflavin (vitamin B2) 0,8 mg/ml Pyridoksin (vitamin B6) 10 mg/ml Ampulle 2 – 5 ml inneholder: ^{1,2} Askorbinsyre (vitamin C) 100 mg/ml Nikotinamid (vitamin B3) 32 mg/ml Glukose, anhydrt 200 mg/ml		<u>Fortynningsvæske</u> ^{1,2} NaCl 9 mg/ml eller glukose 50mg/ml. <u>IV infusjon</u> : ^{1,2} 10 ml (ampulle 1+2) tilsettes i 50 -100 ml infusjonsvæske	<u>IV infusjon</u> ^{1,2,3} Over 30 minutter.	<u>Etter anbrudd</u> ^{1,2} : 7 timer i RT/KJ	Hvis ikke c- vitamin ønskes, kan kun ampulle 1 gis pasienten. ³
Forslag til dosering og administrasjon: ^{1,2,3} 10 ml (ampulle 1+2) tilsettes 50 -100 ml infusjonsvæske (NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml) og gis IV over 30 minutter. <u>Ved væskerestriksjon</u> : ⁴ 10 ml (ampulle 1+2) kan gis som langsom IV injeksjon over 10 minutter.					
Referanseliste: 1. eMC: Pabrinex Intravenous High Potency Injection, www.medicines.org.uk/emc 2. Pakningsvedlegg Syndrex, JSC Farmak, godkjent 15.08.2023 3. L23.6.2.5 Vitamin B + vitamin C – parenterale, Legemiddelhåndboka (legemiddelhandboka.no) 4. eHåndbok - Pabrinex/Syndrex (vitamin B og C) - blandekort for legemidler til voksne, intensiv /overvåkning (ous-hf.no)					
Utarbeidet av Sykehusapotekene Sørlandet			Dato: 04.10.24		