

 SØRLANDET SYKEHUS				PASIENTER OG BRUKERE		Retningslinje				
BRICKERBLÆRE UTEN CYSTECTOMI						Side 1 av 1				
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.d-27			Gruppe: □		Godkjent dato: 21.01.2025		Gyldig til: 21.01.2027		Revisjon: 2.03	

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

Oversikt over rutiner som gjelder postoperativ ved det aktuelle inngrep

RESPIRASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient
SIRKULASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient
DREN / VENTRIKKELSONDE	2 passive dren til sårhulen. Pass på at det ikke blir undertrykk/vakuum i ballongen
DIURESE	Pasienten har innlagt 2 ureterkateter som kommer ut av stomien og ligger i stomiposen: 1 skråklipt – ligger i venstre ureter 1 rett klipt – ligger i høyre ureter Ureterkateter ligger inni en gjennomsiktig urostomipose som er festet til huden. Det SKAL sjekkes x 1 pr. vakt om det drypper urin fra begge kateterne. P.g.a. infeksjonsfaren skal man ikke ta av posen hver gang. Ved å trekke selve posen fra hverandre slik at ureterkateterne henger fritt inni posen, kan man se om det drypper urin. Hvis det ikke drypper, eller drypper lite, skal operatør kontaktes. Kateterne kan skylles med 5-10 ml (max 20ml) NaCl 9mg/ml. Bruk en grønn venflon. Pasienten har også innlagt et BIO-kateter i stomien – dette for å avlaste anastomosene i stomien.
SMERTESTILLENDE	Smertebehandling av voksne postoperative pasienter EDA smertepumpe epidural smertebehandling
KOST	Fritt flytende ved luftavgang – Pasienten begynner som regel dagen etter med lett kost

Kryssreferanser

II.SOK.KSK.4A.2..2-1

Eksterne referanser

Utarbeidet av: C. H. Fjukstad	Først utgitt: 20.09.2017	Fagansvarlig: O. G. Vinorum	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	
---	------------------------------------	---------------------------------------	--	--