

		<b>PASIENTER OG BRUKERE</b>		<b>Retningslinje</b>
<b>GLANDELSTAGING</b>				Side 1 av 1
Dokument ID: <b>II.SOK.AIO.SSK.2.d-28</b>	Gruppe:	Godkjent dato: <b>17.06.2024</b>	Gyldig til: <b>17.06.2026</b>	Revisjon: <b>1.03</b>

Somatikk Kristiansand\Anestesi, Intensiv, Operasjon\Intensiv - SSK\Pasienter og brukere\Post operative prosedyrer

## Oversikt over rutiner som gjelder postoperativt ved det aktuelle inngrep

RESPIRASJON	<a href="#">Postoperativ mottak og overvåking av pasient</a> Inngrepet gjøres i narkose.
SIRKULASJON	<a href="#">Postoperativ mottak og overvåking av pasient</a> Ved ethvert inngrep kan blødning forekomme. Under dette inngrepet vil det være fare for å skade dype vener i bekkenet. Ta Hgb kontroll ved symptomer på blødning. Penis og pung kan av den grunn bli blålig misfarget. Det vil avta etterhvert. Ved åpen operasjon kan det lekke lymfevæske ut av sårene hos 5-10 %, men dette avtar som oftest raskt.
DIURESE	Pasienten har innlagt urinkateter
SMERTESTILLENDE	<a href="#">Smertestillende behandling av voksne postoperative pasienter</a> Noen kan ha luft smerter i abdomen som forplanter seg helt opp til skulder region(ved laparoscopi).
UTREDNING	Glandelstaging er et ledd i utredning av bl. annet ca. prost. Når prostatakraft er påvist og det ikke er funnet spredning til skjelettet, kan det bli aktuelt med strålebehandling av prostata. Slik behandling forutsetter at det ikke er spredning til lymfeknutene i bekkenet. Lymfeknutene i bekkenet kan fjernes enten ved åpen operasjon eller kikkhullskirurgi (laparoscopi).

### Kryssreferanser

II.KIK.KSE.KSK.4A.2..2-4

Fjerning av lymfeknuter ved prostatakraft - lymfadenektomi - Pasientinformasjon SSHF

### Eksterne referanser

Utarbeidet av: <b>C. H. Fjukstad</b>	Først utgitt: <b>20.09.2017</b>	Fagansvarlig: <b>O. G. Vinorum</b>	Godkjent av: <b>Avd.leder Grete K. Erdvik</b>	
---	------------------------------------	---------------------------------------	--	--