


 SØRLANDET SYKEHUS		PASIENTER OG BRUKERE		Retningslinje
JJ-STENT				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.d-25	Gruppe: 	Godkjent dato: 17.06.2024	Gyldig til: 17.06.2026	Revisjon: 1.03

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

Oversikt over rutiner som gjelder postoperativt ved det aktuelle inngrep

RESPIRASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient
SIRKULASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient
DIURESE	Pasienten har innlagt kateter. Blør det mye, eller vannlatingen stopper, oppsøk lege.
SMERTER	Smertestillende behandling av voksne postoperative pasienter Stenten kan irritere urinveiene, og gir ofte smerter over blæren eller nyren.
DIVERSE	Under behandlingen føres et tynt rørinstrument, cystoskop, gjennom urinrøret til urinblæra. Stenten føres opp i urinlederen til nyren via dette skopet. Hvis urindrenasjen hindres fra nyrene til urinblæren kan nyrene skades, og det legges inn en urinlederstent. Gjennom urinrøret føres stenten opp i urinlederen til nyren. Stenten krøller seg i begge ender (nyrebekken og blæra) for å hindre at den glir ut. Stenten kan gi hyppig vannlating og blod i urinen på grunn av irritasjon av urinveiene. 

Kryssreferanser

<http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/d>

Eksterne referanser

Utarbeidet av: C. H. Fjukstad	Først utgitt: 20.09.2017	Fagansvarlig: O. G. Vinorum	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	
---	------------------------------------	---------------------------------------	--	---