

 SØRLANDET SYKEHUS		PASIENTER OG BRUKERE		Retningslinje
TVP- TRANSVESICAL PROSTATEKTOMI				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.d-29	Gruppe: 	Godkjent dato: 29.07.2024	Gyldig til: 29.07.2026	Revisjon: 1.03

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

Oversikt over rutiner som gjelder postoperativt ved det aktuelle inngrep

RESPIRASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient
SIRKULASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient Obs. evt bradycardi/blodtrykksfall når spinalanestesi går ut. Atropin/Efedrin i akuttskrin. Det blir lagt inn et sårdrain. Observer mengde og at det er vakuum.
DIURESE	Blæren blir sydd og pasienten får et avlastende kateter i 5 dager. Pasientene får blærekateter med gjennomskyll av saltvann i blæren til blødningen avtar. Blæreskylning Det innvendige såret i prostata fører ofte til svie, hyppig vannlating og blod i urinen. Blør det mye eller vannlatingen stopper; kontakt urolog
SMERTESTILLENDE	Smertestillende behandling av voksne postoperative pasienter Pasientene får ofte EDA smertepumpe Epidural smertelindring
DIVERSE	Fjerning av blærehalskjertelen – Transvesikal prostatektomi (TVP) Når prostata er større enn 70-80 gram blir det utført laparotomi

Kryssreferanser
 Fjerning av blærehalskjertel ved åpen operasjon - Transvesikal prostatektomi - Pasientinformasjon SSHF
 Prostatektomi transvesikal (TVP)

Eksterne referanser