

 SØRLANDET SYKEHUS		PASIENTER OG BRUKERE		Retningslinje
SALPINGO-OOFOREKTOMI (LAPARATOMI)				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.d-41	Gruppe: I	Godkjent dato: 29.07.2024	Gyldig til: 29.07.2026	Revisjon: 1.03

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

Oversikt over rutiner som gjelder postoperativt ved det aktuelle inngrep

RESPIRASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient Dersom det er operert i spinalanestesi, obs blodtrykksfall og bradycardi når spinalanestesien går ut. Efedrin/Atropin i akuttskrin på akutt tralle. Lungefysioterapi postoperativt, CPAP rekvireres av fysioterapeut.
SIRKULASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient Litt blødning og utflod fra skjeden kan forekomme, dette er normalt og skal gradvis avta. Obs bandasje/blødning.
SMERTESTILLENDE/ KVALMESTILLENDE	Smertebehandling av voksne postoperative pasienter Disse pasientene får ofte epiduralkateter, som startes på postoperativ etter at spinalbedøvelsen ikke lenger har effekt. Epidural smertebehandling intensiv Disse pasientene er ofte kvalme,så sørge for god kvalmebehandling. Kvalmebehandling av voksne postoperative pasienter
DIURESE	Pasientene har ofte urinkateter. Dersom pasienten ikke har innlagt urinkateter, scanne blæren og engangskateterisere om nødvendig.
DIVERSE	Fjerning av eggstokk/eggleder gjøres ofte laprascopisk på dagkirurgien.

Kryssreferanser
II.KIK.ANE.int.SSA.2.d-26

Eksterne referanser

Utarbeidet av: C. H. Fjukstad	Først utgitt: 26.09.2017	Fagansvarlig: O. G. Vinorum	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	
---	------------------------------------	---------------------------------------	--	--