

 SØRLANDET SYKEHUS				PASIENTER OG BRUKERE		Retningslinje				
UTERUSPROLAPS/KOLPOGRAFI						Side 1 av 1				
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.d-47			Gruppe: □		Godkjent dato: 17.06.2024		Gyldig til: 17.06.2026		Revisjon: 1.03	

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

Oversikt over rutiner som gjelder postoperativt ved det aktuelle inngrep

RESPIRASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient
SIRKULASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient Det legges inn en vaginal kompress, som fjernes samme dag eller dagen etter. Sparsom blødning/blodig utflod er vanlig.
SMERTESTILLENDE	Smertebehandling av voksne postoperative pasienter Det er vanlig å ha smerter bak mot endetarmen.
DIURESE	Pasientene har urinkateter
DIVERSE	Fremfall av livmor. Operasjonen utføres fra skjeden slik at fremre og/eller bakre skjedevegg strammes opp. Blæren blir løftet til sin naturlige plass, og bekkenbunnen trekkes sammen for å styrke bakre skjedevegg. Ofte fjernes livmortappen eller hele livmoren.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

Utarbeidet av: C. H. Fjukstad	Først utgitt: 26.09.2017	Fagansvarlig: O. G. Vinorum	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	
---	------------------------------------	---------------------------------------	--	---