

N02A A05	OKSYKODON OxyNorm®				Blandekort for voksne
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
10 mg/ml inf./inj. - væske ampulle		10 mg/ml fortynnes videre for IV injeksjon / infusjon ^{1,2} 10 mg/ml kan anvendes ufortynnet ved subcutan bolus eller subcutan infusjon.	<u>IV injeksjon^{1,2,3}</u> Over 1- 2 minutter	<u>Ampuller^{1,2,5}</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning^{1,2,5}</u> 24 timer i RT/KJ	OBS! Kan IKKE gis ufortynnet ved IV infusjon/injeksjon ^{1,2} , (må fortynnes til 1mg/ml) <u>Fare ved overdosering:</u> Respirasjonshemming. <u>Vanlige bivirkninger:</u> ^{1,2} Forstoppelse, kvalme, kløe, søvnighet, svimmelhet, hodepine.
Konsentrasjon IV infusjon/injeksjon: 1 mg/ml		<u>Fortynningsvæske^{1,2,4}</u> NaCl 9mg/ml, glukose 50 mg/ml eller vann til injeksjonsvæsker			
Forslag administrasjonsmåte ^{1,2}: <u>Intravenøst (bolus):</u> Fortynnes til 1 mg/ml med 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid, 50 mg/ml (5 %) glukose eller vann til injeksjonsvæsker. 10 mg (1 ml) oksykodon fortynnes med 9 ml fortynningsvæske. <u>Intravenøst (infusjon):</u> Fortynnes til 1 mg/ml med 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid, 50 mg/ml (5 %) glukose eller vann til injeksjonsvæsker. 10 mg (1 ml) oksykodon fortynnes med 9 ml fortynningsvæske.					
Referanseliste: Statens legemiddelverk, norske preparatmtaler (SPC). Felleskatalogen.OxyNorm®, pakningsvedlegg, pasientutgaven, helsepersonell. - Injectable medicines administration guide, 3. Ed., oktober 2010, The Pharmacy Department University College London Hospitals, Wiley-Blackwell Micromedex. Tilgjengelig via Helsebiblioteket. Statens legemiddelverk, Norske legemiddelstandarder, kapittel 6 Oppbevaringstider og veiledende brukstider for sterile legemidler etter anbrudd.					
Utarbeidet av Sykehusapoteket i Kristiansand				Dato: 28.04.2017	