

H01B A04	<b>TERLIPRESSIN</b> <b>Glypressin®</b>				<b>Blandekort</b> <b>for voksne</b>
Styrke	Stamløsning	Videre fortykning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
1 mg, pulver i hetteglass og væske til injeksjonsvæske (5ml)		Tilberedes ved å tilsette den medfølgende oppløsningsvæsken til pulveret <sup>1</sup>  Skal ikke fortynnes videre <sup>1,2</sup>	<u>IV injeksjon</u> <sup>1,2,3</sup> Bolus over 3-5 minutter.  Kan gjentas hver 4-6 time inntil tilfredsstillende respons <sup>1,3,4</sup>  Skal kun gis IV <sup>1</sup>	Ferdig tilberedt oppløsning skal brukes umiddelbart <sup>1</sup>	<u>Infusjonsrelaterte bivirkninger</u> <sup>1,2</sup> Abdominale kramper, hodepine, bradykardi, hypertensjon, perifer iskemi, ansiktsblekhet.  Ekstravasasjon kan gi vevsskade <sup>1,2</sup>
Konsentrasjon: <b>0,2 mg/ml</b>					
<p><b>Tilleggsopplysninger<sup>1</sup>:</b>            For å unngå lokal nekrose på injeksjonsstedet, skal injeksjonen settes intravenøst.</p> <p><b>Y-sett forlikelige væsker<sup>1,2</sup>:</b> Skal ikke blandes med andre legemidler eller infusjonsvæsker.</p> <p><b>Forslag til dosering og administrasjonsmåte</b> <sup>1,2,3,4</sup>:  <u>Blødende øsofagusvaricer:</u>            2 mg (2 hetteglass) settes som bolus IV hver 4-6 time inntil kontroll på blødning. Deretter reduseres dosen til 1 mg (1 hetteglass) IV hver 4-6 time.</p>					
<p>Referanseliste:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Statens legemiddelverk, norske preparatomtaler (SPC).</a></li> <li>Injectable medicines administration guide, 3. Ed., oktober 2010, The Pharmacy Department University College London Hospitals, Wiley-Blackwell.</li> <li><a href="#">Micromedex. Tilgjengelig via Helsebiblioteket.</a></li> <li><a href="#">Norsk legemiddelhandbok, nettutgave 2017.</a></li> </ol>					
Utarbeidet av Sykehusapoteket i Kristiansand				Dato: 04.07.2016	