

Kengrexal TM (cangrelor tetranatrium), PCI

Side 1 av 2

Dokument ID:

II.SOA.MEA.2.MED.KAR-10

Godkjent dato:

23.05.2023

Gyldig til:

23.05.2025

Revisjon:

3.00

Somatikk Arendal/Medisinsk avd. SSA/Pasienter og brukere/Medisinskfaglig/Kardiologi

Indikasjoner:

Kengrexal gis i de tilfellene hvor pasienter ikke er i stand til å ta Plavix/Brilique peroralt før Angio /PCI.

Kontraindikasjoner:

- Aktiv blødning
- Ukontrollert alvorlig hypertensjon
- Tidligere TIA/hjerneslag

Blanding/ Fortynning

1. 5 ml sterilt vann per hetteglass (50 mg)
2. Unngå kraftig blanding
3. Virvle forsiktig til alt er oppløst
4. La skum falle til ro
5. Klar og partikkelfri blanding
6. Trekk ut innhold i hetteglasset og tilsatt 250 ml NaCl(0.9%) eller glucose 5%

Administrasjon

1. bolus trekkes ut av fortynnet oppløsning og gis intravenøst på under et minutt.
2. Infusjon umiddelbart etter bolus.

PCI DOSERINGSTABELL – IV BOLUS + INFUSJON

Pasientvekt	TRINN 1	TRINN 2
	Bolus 30 mikrogram/kg	Infusionshastighet 4 mikrogram/kg/min i 2-4 time*
kg	ml	ml/time
38-42	6	48
43-47	7	54
48-52	7,5	60
53-57	8	66
58-62	9	72
63-67	10	78
68-72	10,5	84
73-77	11	90
78-82	12	96
83-87	13	102
88-92	13,5	108
93-97	14	114
98-102	15	120
103-107	16	126
108-112	16,5	132
113-117	17	138
118-122	18	144
123-127	19	150
128-132	19,5	156
133-137	20	162
138-142	21	168
143-147	22	174
148-152	22,5	180

*Bolus og infusjon skal innledes for oppstart av prosedyren, og skal fortsette i minst 2 timer eller så lenge prosedyren varer, det som måtte være lengst. Infusjonen kan fortsettes i totalt 4 timer, etter legens skjønn.

Kontinuering av Brilique /Plavix

Utarbeidet av: Kari M. Kollmannskog Stifoss/Slobodan Calic	Fagansvarlig: Slobodan Calic	Godkjent av: Geir Noraberg	
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Kengrexal TM (cangrelor tetranatrium), PCI				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOA.MEA.2.MED.KAR-10	Utarbeidet av: Kari M. Kollmannskog Stifoss/Slobodan Calic	Fagansvarlig: Slobodan Calic	Godkjent dato: 23.05.2023	Godkjent av: Geir Noraberg	Revisjon: 3.00

Somatikk Arendal/Medisinsk avd. SSA/Pasienter og brukere/Medisinskfaglig/Kardiologi

Bolusen og infusjon skal startes før prosedyren og fortsettes i minst 2 timer eller så lenge prosedyren varer. Etter legevurdering kan infusjonen fortsettes i total 4 timer. Alle pasientene skal starte med peroral behandling med Brilique eller Plavix. Metningsdose administreres umiddelbart etter avslutning av Kengrexal infusjonen. Alternativ kan en metningsdose med Brilique men ikke Plavix administreres opptil 30 minutter før infusjon avsluttes.

Kryssreferanser

Eksterne referanser