

Brøset Violence Checklist (BVC)

 Dokument ID:
1.4.1-2

 Godkjent dato:
23.04.2021

 Gyldig til:
23.04.2023

 Revisjon:
1.01

Fagspesifikke prosedyrer/Akuttmedisin

Pasientdata

Brøset Violence Checklist (BVC); Pasienten skåres ved hvert skift av f.eks primærpleier senest to timer etter starten på skiftet. Se forøvrig veiledning i prosjektmappe. Fravær av symptom/atferd gir 0 poeng, observert endring i eller tilstedeværende atferd skåres med 1 poeng. F.eks er pasienten vanligvis forvirret vil dette gi skåre 0, men øker forvirringen gis skåre 1. Totalskåre (SUM) er summen av en vertikal kolonne.

Innkøst,dag den / 2000	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc mot gjenstander			
SUM			
Signatur			


Dag ,dag den / 2000	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc mot gjenstander			
SUM			
Signatur			

Dag , dag den / 2000	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc mot gjenstander			
SUM			
Signatur			

Dag ,dag den / 2000	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc mot gjenstander			
SUM			
Signatur			

Dag ,dag den / 2000	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc mot gjenstander			
SUM			
Signatur			

Dag ,dag den / 2000	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc mot gjenstander			
SUM			
Signatur			

		Brøset Violence Checklist (BVC)			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: I.4.1-2	Utarbeidet av: Avdeling Brøseth - St. Olavs hospital	Fagansvarlig: □	Godkjent dato: 23.04.2021	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 1.01

Fagspesifikke prosedyrer/Akuttmedisin

Operasjonalisering av begreper og tolking av resultater:

1 = Atferden er observert

0 = Ingen forekomst

BVC atferd	definisjon
Forvirring	Oppfører seg åpenbart forvirret og desorientert. Kan hende er pasienten ikke orientert for tid og sted samt person.
Irritabilitet	Pasienten blir lett irritert; tåler dårlig andres tilstedeværelse
Støyende atferd	En åpenbart støyende og brautende væremåte; f.eks. slamrer med dører, roper i stedet for å snakke osv.
Fysisk truende	Viser med tydelig kroppspråk at hensikten er å tru en annen person, f.eks. en aggressiv kroppsholdning, tar i en annen persons klær, løfter og hytter med knyttet neve, simulerer skalling retning en annen osv.
Verbalt truende	ett verbalt utbrudd som er mer enn å bare heve stemmen og har til hensikt å ydmyke eller skremme en annen person.
Angrep på ting eller gjenstander	Ett direkte angrep på ting eller gjenstander og ikke en person; slå på eller knusing av vindu, slår eller skaller en gjenstand eller slå i stykker ett møbel.

SUM	= 0	Liten risiko for vold
	=	Moderat risiko for vold. Preventive forholdsregler bør taes.
	1-2	
	> 2	Høy risiko for vold. Preventive forholdsregler <u>skal</u> tas og planer for hvordan møte et eventuelt angrep legges.

Kryssreferanser

[I.4.1-1](#)

[Voldsrisiko- vurdering og registrering - bruk av kritisk info](#)