

INNHold ATONIPOSE SSF

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.SOF.KIF.FG.2.2.3-4

Godkjent dato:

14.11.2024

Revideres innen:

14.11.2026

Sist endret:

14.11.2024

Revisjon:

4.00

Klinikknivå/Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Føde/gyn/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

Atoniposen befinner seg i kjøleskap på fødeavdelingen og i kjøleskap på operasjonsavdelingen

Innhold:

Dokumenter:

- Prosedyre for post partum blødning
- Innhold Atonipose

Sprøyter:

- 4x2 ml
- 2x10 ml
- 2x20 ml

Kanyler

- 3 grønne
- 3 opptrekks kanyler

Na CL 0,9%

- 2x10 ml
- 1x 100 ml

Medikamenter

- Prostinfenem (0,25 mg/ml – 1ml) 2 amp.
- Oksytocin (Syntocinon 5IE/ml – 1 ml) 20 amp
- Methergin (0,2 mg/ml – 1 ml) 1 amp
- Cytotec tbl 0,2 mg 6 tbl
- Cyklokapron (100 mg/ml – 5 ml) 4 amp

 Utarbeidet av:
Eberhard Ruff

 Fagansvarlig:
Eberhard Ruff

Verifisert av:

 Godkjent av:
Overl. Eberhard Ruff

 Dok.nr:
D48198

 SØRLANDET SYKEHU		INNHold ATONIPOSE SSF			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOF.KIF.FG.2.2.3-4	Utarbeidet av: Eberhard Ruff	Fagansvarlig: Eberhard Ruff	Godkjent dato: 14.11.2024	Godkjent av: Overl. Eberhard Ruff	Revisjon: 4.00

Klinikknivå/Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Føde/gyn/Pasienter og brukere

Prostinfenem:

- 15-metyl-PGF2aALFA (Prostinfenem®) 0,25 mg intramuskulært eller intramyometrielt. Kan gjentas etter 15-90 minutter, maksdose 2 mg

Oksytocin

- oksytocindrypp 50 IE/500 ml NaCl/Ringer 150 ml/time intravenøst
- akutte situasjoner for raskere administrering: 10 IE Oxytocin i 100ml NaCl 0,9 %

Methergin

- Methylergometrin 0,2 mg (1 ml) intramuskulært, eller fortynnet med 9 ml 0,9 % NaCl langsomt i.v. Kan gjentas hver 2.-4. time ved behov. (Relativ kontraindikasjon (KI) ved hypertensjon, KI ved koronarsykdom)

Cytotec

- misoprostol (Cytotec®) tabl. 0,2 mg, 2 tabl sublingualt, rektalt eller per os, kan gjentas 2-4 ganger

Cyklokapron

- Traneksamsyre (Cyklokapron®) 1000 mg langsomt i.v. Kan gjentas etter 30 minutter, alternativt som infusjon (1 g/8 timer)

Kryssreferanser

[I.4.8.1.2-15](#)

[II.SOF.KIF.FG.2.2.3-3](#)

[Postpartum blødning. Føde/Barsel SSHF \(PPB\)](#)

[ALVORLIG POSTPARTUM BLØDNING - HANDLINGSPLAN SSF](#)

Eksterne referanser