

Pasient med infeksjon i Operasjonsenheten SSK

Side 1 av 3

Dokumentplassering:
II.SOK.AIO.SSK.5-1

Godkjent dato:
26.04.2024

Revideres innen:
26.04.2026

Sist endret:
26.04.2024

Revisjon:
3.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Smittevern

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

HENSIKT

Sikre at pasienter med infeksjon isoleres på en slik måte at smitteoverføring til andre pasienter, personale og sykehusmiljø reduseres så langt det er praktisk mulig.

MÅLGRUPPE

Enhetens ledelse har ansvar for å gjøre prosedyren kjent for de aktuelle arbeidsgruppene og tilrettelegge for gjennomføring av prosedyren. Hver enkelt arbeidstaker har ansvar for å følge prosedyren.

FREMANGSMÅTE

Når pasient meldes på operasjonsprogrammet skal smittestatus registreres i DIPS, og opplyses til koordinator. Aktuelt isoleringsregime planlegges ut fra liste via link: [1.6.2.6.2.2-1 Infeksjonssykdommer - alfabetisk liste](#)

ISOLERINGSREGIME	SMITTEKILDE	BESKYTTELSEsutstyr (PPE)
Kontaktsmitte	Smitteførende pasient, infeksjøst materiale eller forurenset utstyr og omgivelser	Smittefrakk og hansker.
		Ved fare for sprut: munnbind og eventuelt øyebeskyttelse
Kontaktsmitte med munnbind	Smitteførende pasient eller mulig forurenset materiale, utstyr og omgivelser	Smittefrakk, hansker og munnbind.
		Ved fare for sprut: vurderes bruk av øyebeskyttelse
Dråpesmitte	Pasient, seng, utstyr , gjenstander og flater som kan være forurenset	Hansker og smittefrakk
	Ved opphold nærmere pasienten enn 1m	Munnbind
Luftsmitte	Alle som går inn på stue	Smittefrakk, hansker, munnbind eller åndedrettsvern.
		Pas skal ha munnbind under transport
Åndedrettsvern brukes ved smitteførende lungetuberkulose, meslinger, kirurgisk behandling av kondylomer og konisering. Dersom man ikke er immun også ved: vannkopper og herpes zoster		

- Ved behandling av pasient med infeksjon skal det vurderes behov for to operasjonssykepleiere på stuen, og en på gangen.

Utarbeidet av:
Tiny Renstrøm, Linn Kvåle,
Kristin Engenes Knudsen

Fagansvarlig:
[]

Verifisert av:
[]

Godkjent av:
Fredrik Jensen

Dok.nr:
D50808

 SØRLANDET SYKEHU	Pasient med infeksjon i Operasjonsenheten SSK				Side: 2 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.5-1	Utarbeidet av: Tiny Renstrøm, Linn Kvåle, Kristin Engenes Knudsen	Fagansvarlig: □	Godkjent dato: 26.04.2024	Godkjent av: Fredrik Jensen	Revisjon: 3.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Smittevern

- Valg av operasjonsstue vurderes ut fra inngrepets art, smitteregime, pasientens tilstand og operasjonsstuens egnethet. Stue med sluse foretrekkes.
- Kontakt renholder 2020 som kan forbereder operasjonsstuen til inngrepet.
- Operasjonssykepleier vurderer hvilket inventar som er nødvendig å ha på stuen.
- Inventaret dekkes til med plast.
- Det benyttes smittesko på stuen (plasser smittesko-trallen utenfor aktuell stue).
- Planlegg godt hvilket utstyr som trengs under inngrepet.
- Benytt berøringsfri teknikk ved håndtering av skarpe gjenstander.
- Bruk engangsutstyr så langt det er mulig.
- Dørene inn til operasjonsstuen merkes med aktuelt isoleringsregime.
- Begrens antall døråpninger under behandlingen.

Transport av pasient inn og ut av operasjonsavdelingen

- Pasienten kjøres i seng direkte til operasjonsstuen/forberedelsesrom.
- Pasienten skal komme til operasjonsstuen i ren seng og med rene og tette bandasjer. (Dersom sengen ikke er ren, tilkalles renholder som fjerner tekstiler og desinfiserer sengen, før den byttes ut av portør).
- Pasientsengen plasseres i forberedelse rom.
- Gulvet på operasjonsstuen dekkes til før sengen kan kjøres inn etter inngrepet.

Preparater/ Prøvetaking

- Rekvisisjon tas ikke inn på stuen.
- Tilstreb ren håndtering av prøveglass.
- Synlig tilsølt prøveglass tørkes av med vann og desinfiseres med 70% sprit (smittemerking er overflødig, da alle preparater skal behandles som potensielt smitte).

Rengjøring av utstyr

- Kirurgiske instrumenter tas imot av tekniker/operasjonssykepleier på skyllerommet, og settes direkte i vaskemaskin (P2 langt program).
- Utstyr som ikke tåler varmebehandling: Virkon i 10 min ved ikke synlig forurensing. Ved synlig forurensing Virkon i 30min.

Avfallshåndtering

- Bruk gule avfallsposer inne på stuen (søppel fra før pasienten tas inn er ikke nødvendig å kaste i gul dunk).
- Eventuelle væske suges opp med sug inne på stuen (lukket system).
- Søppelsekker må ikke være mer enn halvfulle.

 SØRLANDET SYKEHU	Pasient med infeksjon i Operasjonsenheten SSK				Side: 3 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.5-1	Utarbeidet av: Tiny Renstrøm, Linn Kvåle, Kristin Engenes Knudsen	Fagansvarlig: □	Godkjent dato: 26.04.2024	Godkjent av: Fredrik Jensen	Revisjon: 3.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Smittevern

- Avfall blir tatt imot av renholdspersonale på skyllerom, før operasjonssykepleier forlater stuen.
- La tildekket utstyr være tildekket etter avtalen med renholdere.
- Beskyttelsesutstyr tas av før operasjonsstue forlates.
- Sko etterlates operasjonsstue.
- Ved synlig søl på arbeidsantrekket, skal man skifte og desinfisere eventuell hud under.

Levering av pasient

Tredje operasjonssykepleier leverer pasient til po/int. Anestesi varsler dem om aktuelt isoleringsregime.

Rengjøring av operasjonsstue

Operasjonssykepleier informerer renholder om aktuelt smitteregime.

Kryssreferanser

I.6.2.6-1	Policydokument smittevern SSHF
I.6.2.6.2.1.1-1	Basale smittevernrutiner - sammendrag
I.6.2.6.2.1.4-6	Renhold på operasjonsstuer
I.6.2.6.2.1.6-1	Desinfeksjon av instrumenter, utstyr - generell retningslinje
I.6.2.6.2.1.8-1	Avfallsrutiner
I.6.2.6.2.2-1	Infeksjonssykdommer - alfabetisk liste
I.6.2.6.2.2-2	Tiltak ved isolering
I.6.2.6.2.2-3	Kontaktsmitte - plakat
I.6.2.6.2.2-4	Kontaktsmitte med munnbind - plakat
I.6.2.6.2.2-5	Dråpesmitte - plakat
I.6.2.6.2.2-6	Luftsmitte - plakat
I.6.2.6.2.2-9	Desinfeksjon/ smittevask ved opphør av isolering og ved flekkdesinfeksjon
II.SOK.AIO.SSK.2.c-4	Pussoperasjoner - forholdsregler Anestesi SSK
II.SOK.AIO.SSK.2.c-5	Pasienter med mistanke om eller påvist viral luftveissmitte, Koronavirus/SARS-CoV-2 som skal til operasjon SSK

Eksterne referanser

<https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/isoleringsveilederen.pdf>
<https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/>