

 SØRLANDET SYKEHUS		Medisinsk serviceklinikk			Prosedyre	
Legemiddel- /kontrastreaksjon oppgaver, Rad. avd. SSA					Side 1 av 2	
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSA.2.12-2		Godkjent dato: 18.03.2025	Gyldig til: 18.03.2027	Dato endret: 18.03.2025	Revisjon: 1.05	

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Pasienter og brukere/Legemiddel/Kontrast

DISTRIBUSJONSliste: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 18.03.2027 uten endringer i dokumentet.

Symptomer på anafylaksi:

Hud/slimhinne (90%)	Respiratoriske (70%)	Gastrointestinale (45%)	Kardiovaskulære (45%)
Urticaria, kløe og rødme, hevelse i leppe, tunge, uvula	Rennende nese, nesetetthet, stemmeforandring, kvelningsfølelse, stridor, kortpustethet, hoste, bronkospasme	Kvalme, brekninger, diaré, magesmerter etc.	Hypotensjon, kaldsvette, svimmelhet, synkope, nedsatt bevissthet, hjertebank etc

Akuttfase

Radiograf oppgaver:

- Stopp injeksjonen
- Ved hjertestans **ring 4410**
Ved alvorlig reaksjon tilkall radiolog tlf. **5479** el. 4124 ved behov anestesi tlf. **5666** el. tlf **4138**
- Hent akuttkofferten og engangs ventilasjonsbag/ resusciteringsbag
- Medikasjon: Gjør klar EpiPen- bruk den ved alvorlig reaksjon (gjentatte doseringer om nødvendig)
- Fri luftveier: Gi oksygen (maske 10 l, nese kateter 4-6 l)
- Leie: Hev bena, løsne stramme klær/belter o.l.

Radiolog oppgaver:

- Vurder behov for anestesi
- Fri luftveier: Gi oksygen (maske 10 l, nese kateter 4-6 l)
- Vurder leie
- Vurder behov for medikamentel behandling:
 - EpiPen
 - Hydrokortison (Solu-Cortef®) 250 mg iv.
 - Antihistamin: Deksklorfeniramin 10 mg i.m. eller langsomt i.v.
 - Adrenalin 0,1 mg/ml, 5ml pr. ampulle
 - Adrenalin 1,0 mg/ml, 1ml pr. ampulle

Avslutningsfase:

Radiograf:

- Notere i DIPS- brukt medikament, batch og pasientreaksjon i merknadsfeltet
- Skriv medikamenter i følgeskjemaet hvis pasienten blir innlagt.
- Melde fra til medisinsansvarlig på Rad. Avd. SSA hvis medikament i akuttkofferten er brukt.
- Fylle selv på annet forbruksmateriell

Radiolog:

- Registrere Cave i DIPS
- Registrere avvik i Kvalitetsportalen

DokumentID:D51944

Utarbeidet av: Vigdis Rasmussen	Fagansvarlig: Kristine H. Dahlslett	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Verifisert av: ☐
---	---	---	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Legemiddel- /kontrastreaksjon oppgaver, Rad. avd. SSA				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSA.2.12-2	Utarbeidet av: Vigdis Rasmussen	Fagansvarlig: Kristine H. Dahlslett	Godkjent dato: 18.03.2025	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 1.05

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Pasienter og brukere/Legemiddel/Kontrast

- Dokumenter symptomer og behandling i beskrivelsen. Gi beskjed til DIPS-koordinator som skal legge inn link mellom kritisk info og beskrivelsen.

Under avviksbehandlingen i ettertid sender Kvalitetskoordinator skjema til Bivirkningsnemda (RELIS) hvis alvorlig eller moderat reaksjon.

Akutt kofferten skal gjennomgå 2 ganger i året av HLR-ansvarlige for å sjekke holdbarhet EpiPen og øvrig utstyr.

Vedlegg:

Kryssreferanser:

[I.3.4.1-11](#)

[Anafylaksi - akuttbehandling SSHF](#)

[I.3.4.1-12](#)

[HLR - Hjerne-/respirasjonsstans SSHF](#)

[II.MSK.FEL.RAD](#)

[Legemiddel-/kontrastmiddelreaksjoner - Radiologiske avdelinger SSHF](#)

[FEL.1.6-1](#)

[II.MSK.Rad](#)

[Akutt koffert - innhold. Rad. avd. SSA](#)

[SSA.2.12-4](#)

Eksterne referanser: