

StatSeal, PCI, SSA

Dokumentplassering:

II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2.1-16

Godkjent dato:

30.10.2024

Revideres innen:

30.10.2026

Sist endret:

30.10.2024

Revisjon:

1.02

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Oppdatering av kilder.

Forlenget gyldighet til 30.10.2026

StatSeal er en liten disk/brikke som settes over innstikksstedet etter radialis-/ ulnarispunksjon ved coronar angiografi. Disken inneholder et hemostatisk materiale, som gjør at blødningen etter arteriepunksjonen vil stanse raskere.

OMFANG

Prosedyren gjelder for personell ved PCI, 1C og 1CC.

StatSeal anvendes hovedsakelig til polikliniske pasienter som skal hjem igjen samme dag. StatSeal kan også anvendes til inneliggende pasienter som skal videre til annet sykehus eller hjem samme dag, for å korte ned observasjonstiden ved SSA.

ANSVAR

PCI-operatør er ansvarlig for korrekt plassering av StatSeal under assistanse fra sykepleier/radiograf på PCI-avdelingen. Etter prosedyren har pasientansvarlig sykepleier ansvar for å følge opp og observere pasienten, og iverksette nødvendige tiltak om blødning skulle oppstå.

UTFØRELSE

- StatSeal-disken legges oppå innstikksstedet under fjerning av introduceren, og en kompresjonsrull (kan også bruke TR-bånd) legges oppå StatSeal-disken.



- Tre kompresjons-tape legges stramt over kompresjonsrullen.




Utarbeidet av:
Marianne Rognli

Fagansvarlig:
Slobodan Calic

Verifisert av:

Godkjent av:
Avd.leder. Geir
Rørbakken

Dok.nr:
D52036

 SØRLANDET SYKEHUS		StatSeal, PCI, SSA			Side: 2 Av: 4
Dokument-id: II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2.1-16	Utarbeidet av: Marianne Rognli	Fagansvarlig: Slobodan Calic	Godkjent dato: 30.10.2024	Godkjent av: Avd.leder. Geir Rørbakken	Revisjon: 1.02

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere

FJERNING AV KOMPRESJON

- Kompresjonen fjernes 1 - 1 ½ time etter prosedyren.
- Før kompresjonen fjernes er det lurt å ha tre tape-remser og en liten tupfer klare.



- Lett forsiktig på kompresjonen, og påse at det ikke blør. Ved fortsatt blødning legges kompresjonen på igjen.
- Når kompresjonsbandasjen er fjernet, er det viktig at StatSeal fortsatt blir sittende på.



- En tupfer legges oppå StatSeal, og festes med tre tape, for å gi et lett press mot innstiksstikkstedet.

Dokument-id:

II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2.1-16

Utarbeidet av:

Marianne Rognli

Fagansvarlig:

Slobodan Calic

Godkjent dato:

30.10.2024

Godkjent av:

Avd.leder. Geir Rørbakken

Revisjon:

1.02


Klinikknivå/Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere



- Man kan med fordel sette på en mikropore-tape på baksiden, så den brune tapen ikke skal løsne.



- Om det oppstår hematom, vil det ofte være nok å komprimerer noen minutter for hånd.
- Pasienten kan dra hjem ca 1 ½ time etter at *kompresjonsbandasjen* er fjernet, og det ikke er tegn til blødning/hematom.
- Etter 24 timer kan pasienten selv fjerne teipen og StatSeal-disken.
- Den lille sårskorpen skal sitte på til den faller av av seg selv etter 2-3 dager.
- Pasienten informeres, og får med seg et informasjonsskjema om StatSeal. [StatSeal \(Pasientinformasjon\), PCI, SSA](#)

 SØRLANDET SYKEHUS	StatSeal, PCI, SSA				Side: 4 Av: 4
Dokument-id: II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2.1-16	Utarbeidet av: Marianne Rognli	Fagansvarlig: Slobodan Calic	Godkjent dato: 30.10.2024	Godkjent av: Avd.leder. Geir Rørbakken	Revisjon: 1.02

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere

Kryssreferanser

[II.SOA.MEA.2.MED.PAS-](#) [StatSeal \(Pasientinformasjon\), PCI, SSA](#)

[12](#)

Eksterne referanser